

La Mourérous


Origine et implantation

Encore appelée « Péone » ou « Rouge de Guillaumes », les origines de la race Mourérous sont peu connues : Selon certaines hypothèses, des souches alpines indigènes ou des importations d'Afrique du Nord auraient contribué à sa constitution génétique.

Originaire des Alpes-Maritimes elle a essaimé dans toute la partie montagneuse de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Préalpes du sud). On la retrouve également dans la Drôme et la Savoie. Au dernier RGA en 2000, 36 300 brebis Mourérous ont été recensées.

Standard de race, caractéristiques et performances

Reconnaissable à sa tête et ses pattes rousses, la Mourérous est un animal élancé, de format moyen (50-60 kg pour les brebis et 70-90 kg pour les béliers) et doté d'une bonne couverture laineuse. Sa tête, dépourvue de cornes, peut porter une liste blanche.



C'est une race adaptée aux milieux secs et froids, avec une bonne aptitude à la marche pour l'alpage et le pâturage sur des parcours. Elle s'adapte également facilement aux longues périodes de bergerie en haute-montagne. L'aptitude de la race à entrer en gestation pendant toutes les saisons de l'année (dessaisonnement) est souvent utilisée dans les élevages.

Systèmes d'élevage et type de production

L'élevage de Mourérous s'articule autour de deux grands systèmes d'élevage :

- L'élevage de montagne qui ne développe généralement qu'un seul agnelage au printemps, avec une production d'agneaux d'herbe, maigres ou finis, et d'agnelles de renouvellement destinées à des éleveurs en race pure ou pratiquant le croisement avec des béliers de race à viande.
- L'élevage avec grande transhumance (migration de juin à octobre vers les pâturages de haute altitude) mais qui devient plus rare. Ces troupeaux ont en général deux agnelages : le principal à l'automne (septembre-octobre) et un rattrapage au printemps, avec engraissement des agneaux en bergerie.



Les agneaux de bergerie sont commercialisés sur le marché régional autour de 15-16 kg de carcasse ou vendus plus tôt en agneaux légers (20 kg de poids vif) et exportés vers l'Espagne ou l'Italie. Les broutards ou tardons nés au printemps, élevés sous la mère en montagne, sont généralement vendus à la descente d'alpage. Ils sont très appréciés par certains consommateurs pour leur saveur particulière.

Signes de Qualité



Agneau de Sisteron (Label Rouge IGP)

Soutenue par la filière locale cette race constitue, avec les deux autres races des Alpes du Sud (Mérinos d'Arles et Préalpes du Sud), le support maternel des agneaux vendus sous la dénomination Agneau de Sisteron, produit Label Rouge et IGP (Indication Géographique Protégée).

Label Rouge Agneau de l'Adret

Dans la région Rhône-Alpes, les éleveurs de la race peuvent s'engager dans la démarche Label Rouge Agneau de l'Adret.



Une sélection depuis 1983

1983 : Création du Syndicat de Défense et de Promotion de la Race Mourérous

2008 : Agrément de l'Organisme de Sélection (OS) GEN'OSE

2010 : Agrément de l'OS Races Ovines du Sud-Est

Structure de l'organisme de sélection




Le Comité de race Mourérous de l'OS Races Ovines du Sud-Est :

- Définit les orientations de la race et des objectifs de sélection
- Gère le fichier racial
- Coordonne la qualification des reproducteurs
- Coordonne le travail technique du centre d'élevage de jeunes béliers situé à Carmejane (Alpes-de-Haute-Provence)

Schéma de sélection

Le schéma de sélection repose sur 15 élevages pour près de 4 120 brebis soit en moyenne des troupeaux de 275 têtes (Bilan contrôle de Performances 2012). Les élevages sont situés sur 2 régions : Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Rhône-Alpes et sur 6 départements.



Répartition des élevages Mourérous en contrôle de performances

La sélection génétique se fait prioritairement sur la voie mâle et sur ascendance : les mâles retenus sont sélectionnés à partir des performances de leurs parents. Les principaux objectifs du schéma de sélection de la race sont :


- Conservation des caractères de la race : morphologie générale de l'animal, rusticité, dessaisonnement
- Amélioration des qualités maternelles
- Amélioration de la résistance à la tremblante



Les performances des brebis recueillies sur 1 mise-bas permettent de classer les femelles. Dans la base inscrite, la répartition est la suivante : 42% de mères à béliers et 14% de mères à agnelles.

La prolificité moyenne des brebis sur œstrus naturel est de 1,23.

Le centre d'élevage des jeunes béliers Mourérous se trouve à Carmejane (Alpes-de-Haute-Provence) qui accueille également les races Préalpes du Sud et Mérinos d'Arles. Chaque année, le centre d'élevage reçoit 2 bandes de 20 à 30 béliers de 4 mois rentrant en janvier et en juillet.



Fonctionnement du centre d'élevage des jeunes béliers Mourérou

La base de sélection Mourérou en quelques chiffres (2012)

Nombre d'éleveur	15
Nombre de brebis	4 121
Taille moyenne des troupeaux	281 brebis
Prolificité (sur œstrus naturel > 19 mois)	1,23
Centre d'élevage des béliers	Ferme expérimentale de Carmejane (04)
Nombre de bande en centre d'élevage	2 (juillet et janvier)
Nombre de béliers par bande	20 à 30

Crédit photos : Maison de la Transhumance, M. Bonnevie